

**POLMED®**

# Test w kierunku nowotworów jelita grubego i okrężnicy **COLOTECT**

Badanie umożliwia wykrycie zmian na wczesnym etapie rozwoju raka jelita grubego, a także **ocenę ryzyka rozwoju choroby.**

**Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej występującym nowotworem i drugim najbardziej śmiertelnym nowotworem na świecie. Badania przesiewowe są szczególnie ważne w przypadku nowotworów jelita grubego, ponieważ nie wykazują one swoistych objawów we wczesnych stadiach rozwoju choroby.**

**Test COLOTECT** pozwala na badanie markerowych genów raka jelita grubego: SDC2, ADHFE1, PPP2R5C. Podczas badania, przy użyciu reakcji qPCR, sprawdzany jest stan metylacji tych genów. Dzięki temu możliwe jest odróżnienie komórek nowotworowych, od komórek prawidłowych. Badanie umożliwia wykrycie zmian na wczesnym etapie rozwoju raka jelita grubego, a także **ocenę ryzyka rozwoju choroby**.

## Wskazania do wykonania:

Badanie COLOTECT przeznaczone jest dla:

- **wszystkich osób, dbających o profilaktykę**, chcących ocenić stan swojego zdrowia i ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. W szczególności dla pacjentów w wieku 50–65 lat oraz dla osób, w których rodzinie wystąpił przypadek raka jelita grubego,
- **dla pacjentów, którzy mają obawy przed wykonaniem kolonoskopii**, która pozwala na wizualizację całego jelita grubego oraz ewentualne usunięcie zmian chorobowych i pobranie wycinków do oceny histopatologicznej, jednak nie każdy pacjent może ją wykonać (np. ze względu na wiek, niektóre stany zapalne jelit, cienkie ściany jelit, uczulenie na podawane środki znieczulające).
- **osób, które ze względu na ograniczenia** nie mogą wykonać diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych,
- **osób z dodatnim wynikiem testu FOBT**, którzy nadal nie chcą poddać się kolonoskopii,
- **osób poniżej 50 roku życia**, którzy nie kwalifikują się jeszcze do kolonoskopii,
- **pacjentów z nieokreślonym krwawieniem w stolcu** (np. pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe).

**Ważne:** Wczesne wykrycie nieprawidłowości jest istotne dla profilaktyki raka jelita grubego i poprawy wskaźnika przeżycia.

## Proces obejmuje:

### Wariant I:

1. Odebranie zestawu pobraniowego z Centrum Medycznego;
2. Pobranie próbki przez pacjenta w warunkach domowych lub w CM;
3. Przyniesienie materiału do CM;
4. Oczekiwanie na wynik w wybranej i zaznaczonej w formularzu formie;
5. 15% zniżki na wizytę lekarską w celu omówienia wyników badania.

## Wariant II:

1. Pacjent wysyła wiadomość na adres: [badaniewdomu@polmed.pl](mailto:badaniewdomu@polmed.pl) – po ustaleniu szczegółów konsultant wysyła Pacjentowi na adres zamieszkania zestaw pobraniowy;
2. Pobranie próbki przez pacjenta w warunkach domowych;
3. Pacjent zamawia na swój koszt kuriera i wysyła materiał bezpośrednio do laboratorium na adres: **Novazym Polska S.A. ul. Człuchowska 26, 60-434 Poznań**;
4. Oczekiwanie na wynik w wybranej i zaznaczonej w formularzu formie;
5. 15% zniżki na wizytę lekarską w celu omówienia wyników badania.

## Realizacja badania:

1. Pakiet badań możesz zrealizować w Centrum Medycznym POLMED wybranym podczas zakupu (wariant I). Adres placówki znajdziesz pod linkiem <https://polmed.pl/placowki/>.
2. Na wizytę należy się umówić (wariant I).
3. Po wykupieniu pakietu (wariant I) przedstawiciel wybranego Centrum Medycznego skontaktuje się z Tobą w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.
4. Przychodząc na badanie okazujesz w placówce otrzymane mailowo potwierdzenie wizyty. Potwierdzenie wystarczy okazać na ekranie telefonu, nie ma potrzeby druku.
5. Do badania nie trzeba być na czczo.
6. Wynik badania jest dostępny w terminie do 10 dni roboczych od dotarcia próbki do laboratorium.
7. Po otrzymaniu wyniku możesz umówić się na konsultację w POLMED – wizytę opłacisz z 15% rabatem (rabat nie łączy się z innymi rabatami i promocjami).

## UWAGA:

**Pakiet jest ważny 90 dni od daty zakupu.**

## Infolinia czynna 24/7:

**801 033 200**

Połączenie z telefonów stacjonarnych (wg stawki operatora).

**58 775 95 99**

Połączenie z telefonów komórkowych (wg stawki operatora).